



نخيل نيوز/ متابعة

كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة عن زيادة في معدلات الدقة في تشخيص الأمراض بأقسام الطوارئ في المستشفيات الأميركية، حيث تظهر معدلات الدقة بشكل عام مرتفعة، وأن نسبة الخطأ لا تتجاوز 5.7%.

الدراسة التي أجرتها هيئة أبحاث الرعاية الصحية والجودة في الولايات المتحدة، استندت إلى 279 ورقة بحثية تناولت مشكلة أخطاء التشخيص، أظهرت أن 2% من المرضى الذين يتعرضون لأخطاء في تشخيص حالتهم الصحية يتعرضون لمضاعفات، وأن نسبة من يتعرضون لمشكلات صحية خطيرة بسبب أخطاء التشخيص تبلغ 0.3%.

الباحثون توصلوا إلى أن خمس مشكلات صحية تشكل 39% من أخطاء التشخيص وما يترتب عليها من مضاعفات، تتضمن السكتات الدماغية والنوبات القلبية وانسداد الأوعية الدموية وإصابات الحبل الشوكي، وجلطات الأوردة العميقة في الجسم.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأعراض الصحية الغامضة أو غير المحددة قد تسبب في خطأ في تشخيص الحالة المرضية، مشيرة إلى أن أعراضاً كالدوار تزيد احتمالات خطأ التشخيص بمعدل 14 ضعفاً في حالات مثل السكتة الدماغية.

واستنتج الباحثون أنه يتعين العمل على تطوير حلول شاملة لتعزيز عملية تشخيص الحالات المرضية، مع التركيز على الأخطاء الشائعة في التشخيص المتعلقة بأمراض رئيسية والتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة.